



Protocolo da Dengue/Chikungunya

Dê uma dose de 6 gotas na primeira hora e continue com uma dose de 3 gotas de hora em hora até ficar bem. Se na primeira dose de 6 gotas der muita náusea não faça mais uma dose de 6 gotas, faça uma com 3 gotas para a segunda dose. Se a segunda dose com 3 gotas causarem náusea, reduza para 1 gota por hora. Se a náusea persistir, reduza para ½ gota por hora. Se essa náusea não existia antes de tomar MMS e depois de baixar para ½ gota ainda persistir os sintomas, pare de tomar MMS até que a náusea suma. Então volte a tomar doses de 1 gota por hora, e aumente para 2 gotas por hora por 4 horas seguidas até chegar a 3 gotas por hora. Não passe de 3 gotas por hora até que a Dengue retroceda. Continue com 3 gotas até que a Dengue suma, mas apenas se o MMS não estiver causando náuseas. Lembre-se não cause náuseas a si mesmo, mas se o MMS causar náuseas, reduza o número de gotas, mas se já tivesse náuseas antes de tomar MMS aí sim tome as doses completas.

A verdade é que a Dengue é causada por um vírus, e leva uma série de doses de dióxido de cloro para eliminar o vírus. O parasita da malária, por outro lado, é morto por um enorme choque (que é a dose de 18 gotas).

Em raras exceções quando a dengue causa sangramentos, não pare o Protocolo – continue tomando MMS como indicado acima.

NOTA: nós temos testemunhos de pessoas tendo sua “saúde restaurada” da febre da dengue por tomar ½ cápsula de MMS2 (Hipoclorito de Cálcio) a cada 2 horas de 5-6 vezes por dia. E com 3-5 dias a febre da dengue sumiu!

Sanderson Saraiva de Souza Oliveira, Bispo da Igreja Gênesis II da Saúde e Cura
Saraiva.sanderson@gmail.com (92) 99200-4535